



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز
بیمارستان ثامن الحجج

روانپریشی ناشی از سوء مصرف مواد

بخش اعصاب و روان

آخرین بازنگری آذر ماه ۱۴۰۴

درمان

درمان بستگی به عامل به وجود آورنده و شدت علائم دارد.

اما به طور معمول برای درمان لازم است که فرد در بیمارستان بستری شود و تحت درمان با داروهای ضد روانپریشی قرار گیرد.

داروهای ضد جنون

مثل ریسپریدون، الانزاپین، هالوپریدول، کلوزاپین



منبع: www.dualdiagnosis.org

علائم

* تغییر در احساسات: عدم واکنش به

احساسات، مشکل در ابراز احساسات

* خواب آلودگی و فقدان انگیزه

* انزوای اجتماعی

* عدم پیوستگی بین فکر و عمل

* رفتار خشونت آمیز

* افسردگی

* اضطراب

* افکار آسیب به خود

* سخنان نامفهوم

* توهم

روانپریشی:

به حالت غیر نرمال ذهن گفته می شود که شخص ارتباط خود را با واقعیت از دست می دهد

افرادی که روانپریشی را تجربه می کنند، تغییراتی در شخصیت و طرز تفکر خود نشان می دهند.

بسته به شدت میزان روانپریشی، ممکن است رفتارهای عجیب و غریب، اختلال در تعامل با دیگران و مشکل در انجام کارهای روزمره داشته باشند. اما ممکن است توهم، هذیان، را تجربه کنند.



توهم: شنیدن و دیدن اجسامی که وجود خارجی ندارد و دیگران قادر به شنیدن آن صداها و دیدن آن اجسام نمی باشند.

هذیان: باور غلط که بیمار به آن اصرار می ورزد و این باور، اصلاح نمی شود و با وضعیت فرهنگی فرد نیز متناسب نمی باشد.



روانپریشی ناشی از سوء مصرف مواد:

اختلالی است که به دنبال اثرات سمی داروها و مواد به وجود می آید.

روانپریشی ناشی از مصرف مواد، همراه با اختلال در هوشیاری و توهمات بینایی تظاهر می کند و وضعیتی است که فرد قدرت تشخیص و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را از دست می دهد و توهم و هذیان را تجربه می کند.

مواردی که مورد سوء مصرف قرار می گیرد

عبارتند از:

- * الکل
- * حشیش
- * داروهای آرامبخش
- * کوکائین
- * مواد محرک (آمفتامین ها)
- * مواد مخدر