



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج (ع)

انواع مسمومیت



آخرین بازنگری فروردین ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سایت بیمارستان تماس حاصل
نمائید.

(آموزش به بیمار)

منبع: آموزش به بیمار ماری، ام، کامینیو

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir/fa

آموزش حین ترخیص در انواع مسمومیت:

مسمومیت با انواع قرص و شربت:

• از مصرف خودسرانه دارو بپزید و دارو را
طبق نزد پزشک مصرف کنید.

• به تاریخ مصرف دارو توجه کنید داروها را
در جای گرم و مرطوب و دور از نور قرار
دهید.

• شربتی را که چندین ماه باز شده حتی اگر
تاریخ آن نگذشته استفاده نکنید.

• داروهای بیماران مبتلا به افسردگی یا
بیمارانی که سابقه خودکشی دارند دور از
دسترس آنها قرار دهید.



• در صورت مصرف داروهای تشنج و

بیماران با سابقه تشنج و در بیماران قلبی

تحریک به استفراغ ممنون می باشد.

• در صورتی که به دنبال مصرف قرص و

شربت افت هوشیاری باشد فرد را به

استفراغ نکنید.

• در خانمهای حامله در ۳ ماهی اول

بارداری و سه ماهه آخر بارداری نباید

فرد را تحریک به استفراغ کرد.

• در صورت مسمومیت با قرص آهن و

اسپرین و داروهای نظافت و واکتیس

مصرف شیر کاربرد دارد.

• در صورت مسمومیت با نفت و

ارگانوفسفره مصرف شیر ممنوع

می باشد.



مسمومیت با تریاک و متادون و ترکیبات آنها:

- به هیچ عنوان از تریاک به عنوان داروی ضد اسهال در اطفال و نوزادان استفاده نکنید.
- به دنبال مسمومیت با تریاک فرد دچار کاهش سطح هوشیاری و تنفس کند و سطحی شده که سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کنید.
- به علت اینکه افت هوشیاری می دهد از تحریک بیمار به استفراغ جلوگیری و درون باعث اسپراسیون می شود.
- مسمومیت با تریاک باعث خارش بدن بخصوص در ناحیه قفسه سینه صورت و بینی می شود که بلافاصله به بیمارستان مراجعه کنید.
- از نگه داری شربت متادون در یخچال و در کنار بقیه ی نوشیدنی ها خودداری شود.
- بعد از ترخیص از بیمارستان تا چند روز باید مواظب باشید چون تریاک مجدداً از طریق خون به داخل معده تراوش می کند و مجدداً جذب می شود.



مسمومیت با الکل:

- از نوع مصرفی سوال شود که دست ساز بوده یا اینکه الکل استاندارد بوده است.
- در صورت استفراغ خونی یا مدفوع قیری و سیاه رنگ حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- حتماً کنترل قند خون شود چون باعث افت قند خون می شود.
- در صورت اختلال هوشیاری تاری دید ، افزایش تعداد تنفس ، اختلال در تعادل سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید.



مسمومیت با ماده شوینده و

ماده شیمیایی:

- از مخلوط کردن مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و جرم گیر با فراورده های سفید کننده خودداری کنید.
- در صورت بلع مواد شوینده هرگز فرد را تحریک به استفراغ نکنید.
- در مسمومیت با مواد شیمیایی در و پنجره ها را باز کنید و از استفاده از یک دستمال خیس جلوی دهان و بینی قرار دهید بیمار را در محیط آزاد و سر فرد را به یک طرف قرار دهید.

