



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج (ع)

(آموزش به بیمار)

نوزادان

انتروکولیت نکروزان

(NEC)

بخش NICU

آخرین بازنگری تابستان ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان
مراجعه نمائید.

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir

بیماری شدیداً قابل انتقال به سایر نوزادان
است. پس در هر بار تماس با نوزاد
دستهایتان را ضدعفونی کرده و

از دست زدن به سایر نوزادان یا سایر
وسایل اجتناب کنید.

دوره درمان باید کامل شود بنابراین در این
مدت صبور باشید.

توصیه های خود مراقبتی:

.....

.....

قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم .

با آرزوی بهبودی و سلامتی روز افزون نوزاد دلبندتان

منبع: نلسون



بیماری NEC یا انتروکولیت نکروزان:

یک بیماری عفونی مربوط به دستگاه گوارش نوزاد است

علائم بیماری NEC کدامند؟

میکروبها باعث آسیب جدار روده نوزاد میشوند. در نتیجه نوزاد دچار احتباس گاز در روده شده و قادر به تحمل تغذیه نیست. همچنین با توجه به شدت بیماری نوزاد دچار علائم دیگری مانند علائم زیر میشود.

تغییرات درجه حرارت (تب یا کاهش دما)

بی حالی

رنگ پریدگی

افت قند خون

مشکلات تنفسی

کم خونی



بیماری NEC چگونه تشخیص داده می شود؟

با توجه به تغییرات حال عمومی نوزاد: عکس های رادیوگرافی و نتایج آزمایشات بیماری تشخیص داده می شود.

بیماری NEC چگونه درمان می شود؟

اگر درمان به موقع و کامل انجام نشود یا اگر نوزاد خیلی ضعیف باشد ممکن است عفونت شدید باعث سوراخ شدن روده شود. درمان شامل موارد زیر است :

*قطع تغذیه خوراکی

*گذاشتن لوله معده برای کم کردن نفخ و فشار روده

*شروع درمان با آنتی بیوتیک و سرم و گاهی به تزریق خون نیاز می شود.



انجام آزمایشات و عکس برداری های مکرر برای کنترل شرایط نوزاد و کنترل سیر بیماری

آنچه والدین باید بدانند و اجرا کنند :

بسیاری از نوزادان با درمان به موقع بهبود می یابند.

درصد کمی نیاز به اقدامات جراحی پیدا می کنند.

میزان بهبودی نوزاد به عوامل زیادی مانند وزن و سن حاملگی نوزاد و نداشتن مشکلات همراه و شدت بیماری که نوزاد را درگیر کرده است مربوط است.

حضور مادر خصوصا بعد از بهبودی نسبی وضعیت نوزاد تا شروع مجدد تغذیه در تامین آرامش و تسریع روند درمان بیماری تاثیرگذار است.

با توجه به شرایط بخش همکاری لازم را داشته باشید و از مقررات بخش پیروی کنید.

