




دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج
(آموزش به بیمار)

سونداژ



آخرین بازنگری فروردین ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سایت بیمارستان تماس حاصل
نمائید.

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir/fa

پیشگیری از عفونت در بیماران با لوله ادراری (سونداژ)

۱. کیسه ادراری هرگز نباید با کف زمین تماس
داشته باشد.

۲. کیسه ادراری نباید بالا تر از سطح مثانه قرار
گیرد { نباید کیسه بیمار روی تخت بیمار
گذاشته شود. } زیرا باعث بازگشت ادرار
آلوده به مثانه بیمار می شود در صورت نیاز به
جا به جایی لوله سونداژ را با گیره ببندید.

۳. لوله ادراری پیچ خوردگی نداشته باشد.

۴. به منظور پیشگیری از خطر تکثیر باکتری
هر هشت ساعت یکبار کیسه ادراری را خالی
کنید در صورتی که حجم ادرار زیاد باشد این
فاصله را کم کنید توجه: قبل از خالی کردن
کیسه ادراری بیمار حتما با پرستار بیمار خود
صحبت کنید.

۵. برای هر کدام از بیماران لگن جداگانه ای
جهت تخلیه کیسه ادرار استفاده شود.

۶. قبل وبعد لمس کیسه ادراری دست خود را
بشوید.

۷. ناحیه پرینه را دو بار در روز توسط آب و
صابون شستشو نمائید و کاملا خشک کنید.

منبع: کتاب مرجع داخلی - جراحی برونر سوارث