



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

بیمارستان ثامن الحجج (ع)

(آموزش به بیمار)

فاویسم یا بیماری باقلا



بازنگری تابستان ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به

سایت بیمارستان مراجعه نمایید.

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir

منبع: کتاب نلسون کودکان

ب - بیماریها و عفونتها :

ویروسهای تنفسی ، هپاتیت عفونی ،
مونوکلایوز عفونی ، عفونتهای باکتریایی ،
استرس محیطی ، اسیدوز متابولیک ،
اسیدوز دیابتی
نکات مهم :

- ۱- در صورت وجود یک فرد مبتلا در خانواده بررسی برای همه افراد خانواده خصوصا فرزندان دیگر (اعم از پسر و دختر) لازم است . همچنین توصیه می شود سایر افراد مذکر بستگان نزدیک (شامل پسر خاله ، پسر دایی ، پسر عمو ، پسر عمه) نیز بررسی شوند .
- ۲- فاویسم با آلرژی تفاوت دارد یعنی کسانی که فاویسمی هستند ، فکر نکنند که در مقابل غذاهای دیگر هم حساسند یا آلرژی دارند .
- ۳- در صورت عدم درمان مناسب ، احتمال آسیب دیدن کلیه ها و نیز کم خونی شدید و صدمات حاصل از آن وجود دارد .
- ۴- این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها اقدام موثر ، پیشگیری از بروز حمله همولیز یا پرهیز از مواجهه با مواد اکسیدان و در صورت بروز حمله مراجعه سریع به پزشک جهت اقدامات نگهدارنده جهت پیشگیری از عوارض همولیزاست .

توصیه های خود مراقبتی :

.....

.....



بیماری فاویسم را بیشتر بشناسید

فاویسم یا بیماری باقلا :

یک بیماری ارثی می باشد که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلبول قرمز G.P.D ایجاد می شود . این بیماری وابسته به جنس بوده و بیشتر در جنس مذکر دیده می شود .

بیماران در حالت عادی کاملاً طبیعی بوده اما ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از خوردن مواد اکسیدان مانند باقلا داروهای خاص و ... فرد به طور ناگهانی دچار می شود . سن شیوع این بیماری یک تا ۱۰ سالگی است ، اما بیشتر مبتلایان در رده سنی زیر ۵ سال قرار دارند . در کودکان زیر یک سال نیز ممکن است بیماری از طریق خوردن شیر مادر اتفاق بیفتد . هر چند خطر بروز عارضه فاویسم پس از ده سالگی کاهش می یابد ، اما بهتر است همیشه مراقب او باشید

اقدامات که والدین کودک مبتلا به فاویسم باید انجام دهند :

- ۱- شناخت دقیق عواملی که موجب بروز حملات بیماری می شوند از جمله مصرف باقلا و برخی داروهای تخصصی و پرهیز از مصرف خود سرانه آنها .
- ۲- برای تسکین درد یا پایین آوردن تب کودکان ، هرگز به او آسپرین ندهید . از استامینوفن ، فقط با مقداری که پزشک تجویز کرده است بهره بگیرید .
- ۳- در صورت مراجعه به پزشک و یا مراکز درمانی ابتلا به فاویسم را اعلام کنید تا داروهای بی خطر برای فرزندان تجویز شود .
- ۴- کودک مبتلا به فاویسم نمی تواند و نباید خون خود را اهدا کند .
- ۵- فرزندان باید از خوردن سبزیجات زیاد و بیش از حد معمول پرهیز کند .

۶- اگر مادری هستید که به کودکان شیر می دهید هرگز باقلا و آسپرین نخورید و در مورد مصرف سایر داروها نیز با پزشک مشورت کنید .

۷- برخی از بیماران که میزان فعالیت آنزیمی در آنها بسیار کم است با استنشاق بوی باقلای تازه و در مواردی حتی عبور از کنار مزرعه باقلا و یا حضور در خانه ای که در آن باقلایاک شده است باعث بروز همولیز می شود . بنابراین پرهیز از مواجهه به معنی نخوردن آن به تنهایی نیست

***عواملی که در بیماری فاویسم منع مصرف دارند یا با احتیاط مصرف شوند :

۱- داروها که :

الف - واکنش های شدید می دهند :

آسپرین (آ - اس - آ) استائیلید ، استیل فن هیدرازین ، ایزونیازید ، نورفلوکساسین ، فنزون فنزوبوتازون ، سولفا سالازین ، آمینو سالیسیلیک اسید ، بتا نفتول ، کلروکین ، سیپروفلوکساسین ، کوتریموکسازول ، داپسون ، دیمرکاپرول ، نالیدیکسیک اسید نیریدازول ، کیتا کرین ، استیبوفن ، فورازولیدون نیتروفرانتوین ، تیزوسولفون گلینیکلامید ، گلوکوسولفون ، ایزوبوتل نترات ، ویتامین ک ، اوریناز ، پاماکین ، پنتاکین ، فیناسیتین پریماکین ، فینازوپیریدین ، پروپسید ، سولفوکسون سولفاسیتامید ، سولفادیمیدین ، سولفافورازول ، سولفاپیریدین ، سولفامتوکسازول ، سولفاتیلامید

ب - همولیز خفیف می دهند :

آمینوپایرین ، آنتازولین ، کلشی سین ، دوپامین ، فینی توین ، پروکاین آمید ، پزگوآنیل ، کیناکرین ، کینین ، کینیدین ، استرپتومايسين ، سولفادیازین ، ویتامین ث ، استامینوفن

سایر عوامل ها :

الف - مواد شیمیایی : بنزین ، نفتالین ، آرسین ، حشره کش ها ، اسپری ، رنگ مو ، رنگهای آنیلینی متیدن بلو ، تولویدین بلو

کودکان دچار فاویسم باید از باقلا دور نگاه داشته شوند . حتی استنشام بوی باقلا در بعضی کودکان می تواند باعث شروع علائم بیماری گردد .

