



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج (ع)
(آموزش به بیمار)

تاکي پنه گذرای نوزادان



مادر گرامی:

پمفلتي که در دست داريد حاوي اطلاعات ضروري در خصوص نگهداري از فرزند دلبندتان و چگونگي روند درمان و مراقبت آن مي باشد.

آخرين بازنگري تابستان ۱۴۰۵

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر به سايت بیمارستان مراجعه
نمائيد.

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir

فواید دستگاه حمایت تنفسی:

- ✓ بهبود اکسیژن رسانی
- ✓ بهبود بخشیدن به عملکرد ریه
- ✓ جلوگیری از روی هم خوابیدن بافت ریه
- ✓ کاهش احتمال قطع تنفس

علائم بهبودی:

- ✓ کاهش تعداد تنفس
- ✓ تنفس منظم و از بین رفتن تنفس سخت
- ✓ برطرف شدن کیبودی انتهای اندام ها
- ✓ بعد از برطرف شدن علائم و تغذیه کامل از سینه مادر، نوزاد آماده ترخیص می باشد.

منبع:

نلسون (ترجمه): دکتر الهه نوروزی- دکتر رضا فلاح-
دکتر مسعود محمد پور- دکتر محمد آیتی (۲۰۱۶)

خود مراقبتی:

.....
.....
.....

به امید بهبودی کامل نوزاد شما



تاکی پنه گذرای نوزادان

تاکی پنه گذرای نوزادان به معنی تنفس سخت و تند ناشی از تاخیر در جذب مایع باقی مانده از زمان جنینی در ریه نوزاد، می باشد.

علت این تنفس سخت و تند این است که ریه های نوزاد در تلاشند تا اکسیژن بیشتری به دست بیاورند.

در طول رشد دوران جنینی ریه ها حاوی مایع هستند . وقتی نوزاد به زمان نزدیک تولد می رسد، بدن وی شروع، به جذب این مایع می کند به طوری که ریه ها بتوانند برای تنفس هوا پس از تولد، آماده شوند.



چه نوزادانی مبتلا می شوند؟

- ✓ نوزادان نارس
- ✓ نوزادان بالغی که به طریق سزارین متولد شده اند
- ✓ سزارین تسریع شده
- ✓ همه نوزادانی که در پاک سازی مایع از ریه دچار مشکل بوده اند
- ✓ نوزادان مادران دیابتی و آسمی

✓ عوامل خطر کدامند؟

- ✓ آسم و دیابت مادری.
- ✓ نوزادان نارس دچار سندرم دیسترس تنفسی.
- ✓ نوزادان بالغی که مایع آمنیوتیک مکونیومی داشته اند.
- ✓ بیماری های تنفسی نوزادان، مخصوصا سندرم زجر تنفسی در جنس پسر و در متولدین سزارین انتخابی بیش از متولدین سزارین اورژانسی و زایمان طبیعی بوده است.

علائم:

- احساس تنگی نفس
- بروز رنگ آبی روی انگشتان و لب ها
- به داخل کشیده شدن یا تورفتن قفسه سینه به هنگام نفس کشیدن

درمان:

زجر خفیف تنفسی به علت تاکی پنه گذرای نوزاد اغلب طی ساعت اول پس از تولد، وقتی که باقی مانده مایع ریه، بازجذب می شود، بهبود می یابد. اگر زجر تنفسی بیشتر از ۴ ساعت ادامه یابد، نوزاد به ارزیابی بیشتر و رادیوگرافی (عکسبرداری) قفسه سینه برای تشخیص، نیاز دارد. بهبودی معمولا ظرف ۲ الی ۳ روز صورت می گیرد و درمان حمایتی است که شامل: دادن اکسیژن و پالس اکسی متری (پایش سطح اکسیژن خون) می باشد. در صورتی که دیسترس تنفسی، بدترشد، بسته به شرایط نوزاد، تصمیم گیری می شود. که معمولا نوزاد تحت حمایت تنفسی بادرستگاه قرار می گیرد.

