




دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج (ع)
(آموزش به بیمار)




آخرین بازنگری: فروردین ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان مراجعه
نمائید.


Samenalhojajhp.sirums.ac.ir/fa

روش جایگزین



یک روش جراحی است که در آن یک لاپاراسکوپ و
دیگر ابزارهای جراحی از طریق برشهای کوچک وارد
شکم میشوند، فضای داخل شکم و مراحل انجام عمل
در نمایشگری نشان داده میشود. لاپاروسکوپی با
حداقل تهاجم است، بنابراین بیمار از بهبودی سریعتر،
زخم جراحی کوچکتر و با عوارض کمتری روبه رو

می باشد



لاپاراتومی: به معنای ایجاد برش‌های کوچک در دیواره □ شکم و ورود به حفره شکم به منظور اکتشاف، تشخیص و درمان احتمالی است

لاپاراتومی اکتشافی در صورتی انجام می‌شود که جراح نتواند با روش‌های دیگر به تشخیص قطعی در مورد وضعیت بیمار برسد. موارد مصرف لاپاراتومی

برخی از شرایطی که به لاپاراتومی می‌انجامد عبارتند از:

اندام‌های شکمی سرطانی

التهاب صفاق ([پریتونیت](#))، التهاب آپاندیس ([آپاندیسیت](#))

التهاب لوزالمعده ([پانکراتیت](#))

[آبسه](#)

چسبندگی (پس از [تروما](#) یا جراحی)

التهاب کیسه مانند در دیواره روده‌ها ([دیورتیکولیت](#))

سوراخ شدن یا [انسداد روده](#)

[حاملگی خارج رحمی](#)

مراقبت‌های قبل از عمل جراحی :

انجام آزمایشات و عکس‌های لازم قبل از عمل

شیو کردن ناحیه عمل

گرفتن رضایت نامه

خارج کردن زیور آلات و دندان مصنوعی

قطع کردن خوردن و آشامیدن هشت ساعت قبل عمل

مراقبت‌های بعد از عمل

انتقال بیمار به اتاق ریکاوری و نظارت پرستاران تا به هوش آمدن کامل او

تزریق داروهایی برای جلوگیری از ایجاد عفونت

تا زمانی که اثر داروهای بیهوشی از بین نرفته خوردن و آشامیدن ممنوع است، اما بعد از آن بیمار می‌تواند با اجازه پزشک به مرور از رژیم مایعات استفاده کند

بیمار باید به زودی به بلند شدن و راه رفتن در اطراف خود بپردازد.

باز حفاظت از بهار، دقت است تمیز های تنفس انجام

ممکن است در محل جراحی برای شما درن (لوله) گذاشته شود بعد از چند روز با اجازه پزشک معالج خارج میشود

پی گیری ها :

زمان بهبودی برای هر فرد متفاوت است. امکان است ۴ تا ۶ هفته طول بکشد. بیمار باید با پزشک خود برای پیگیری پیشرفت روند درمان و برداشتن بخیه‌ها در تماس باشد عوارض بعد از جراحی : خونریزی، عفونت ،

علائم هشدار:

در صورت تب مداوم، خروج ترشح چرکی از محل زخم، قرمزی و تورم ناحیه جراحی، تپش قلب مداوم، سریعاً به پزشک مراجعه کنید داروهای تجویز شده پزشک را در زمان مشخص شده میل کنید در تاریخ مشخص شده به مطب پزشک معالج مراجعه کنید پانسمان را یکروز در میان تایک هفته تعویض کنید

منبع: کتاب پرستاری جراحی برونر سوارث

