



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج

(آموزش به بیمار)

کاتر دوجداره



آخرین بازنگری تابستان ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سایت بیمارستان تماس حاصل
نمائید.

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir/fa

مراقب تا شدگی و یا خمیدگی لوله ها
باشید و با آنها بازی نکنید و سر پوش
لوله ها را باز نکنید.

با استفاده از ثابت کننده های لوله های
کاتتر روی پانسمان گردن از حرکتهای
بی مورد لوله ها جلوگیری نمائید.

در صورت احساس درد شدید در محل
لوله ها و یا در قفسه سینه فوراً به
پزشک مراجعه نمائید.

در صورت باز شدن بخیه ها و یا
جابجایی لوله ها قبل از اقدام به هر
کاری فوراً به پزشک مربوطه
مراجعه کنید.

کلامپ قطع جریان خون که در هر
شاخک لوله ها است به هیچ عنوان
باز و بسته نگردد.

به پیچ های سر لوله ها دست نزنید.

در صورت مشاهده قرمزی التهاب.

هنگام باز نمودن کاتتر ها توسط
پرستار حین دیالیز حتماً جهت
پیشگیری از انتقال عفونت از ماسک
استفاده نمائید.



مراقبت از کاتتر دو جداره داخل

گردن در ورید ساب کلاوین یا

ژوگولار:

برای همودیالیز نمودن و خروج سموم از بدن نیاز به جریان خون مناسب برای دستگاه دیالیز داریم و تا زمانی که بتوان از فیستول استفاده نمود میبایست بطور موقت از یک کاتتر جهت دیالیز استفاده نماییم لذا جهت پیشگیری از عوارضی مانند عفونت، خونریزی یا خارج شدن این کاتتر نیاز به همکاری در رعایت موارد ذیل داریم:

محل کاتتر حتی الامکان هفته ای ۳ بار پانسمان شود.



در صورت داشتن کاتتر دائم تعویض پانسمان باید تا مدت ۶-۸ هفته انجام گیرد و پس از آن نیاز به وجود پانسمان نمی باشد.

به هنگام حمام کردن روی پانسمان و لوله ها را با پلاستیک پوشانده و بعد سر و بدن را جدا گانه بشوئید. (مراقب باشید محل ورود لوله ها در گردن خیس نشود)



در صورت داشتن کاتتر دائم پس از ۸ هفته می توانید به راحتی حمام کنید و بهتر است پس از حمام محل کاتتر دائم را با ششوار خشک کنید.

در صورت بروز هر گونه تحرک و خارش در محل بخیه ها به هیچ عنوان به آن دست نزنید.

از ورود ضربه و یا ایجاد کشش بر روی لوله ها جلوگیری نمایید.

منابع: کتاب مرجع داخلی - جراحی برونر سوارث

