

در چه مواردی باید سریعاً به پزشک مراجعه کنیم؟

- باز شدن بخیه ها یا آسیب بخیه ها
- تورم و قرمزی و درد زیاد محل زخم
- خروج چرک یا ترشحات سبز رنگ از زخم یا تشدید ترشحات اولیه
- استشمام بوی بد از زخم
- بروز خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف محل زخم
- محدودیت حرکت، درد، تورم، در انگشتان یا مفصل نزدیک زخم
- بروز تب
- برجسته و دردناک شدن غده های لنفاوی زیر بغل گردن یا کشاله ران (نزدیک به محل زخم)

منبع: داخلی-جراحی برونر سوارث




اگر در عرض پنج سال واکسن کزاز
نزده اید ظرف ۴۸ ساعت بعد از
آسیب واکسن کزاز تزریق کنید.

در گاز گرفتگی با حیوان نیاز به
تزریق واکسن هاری هست این
واکسن توسط همکاران مرکز
بهداشت تزریق میگردد نوبت اول
باید در اولین فرصت تزریق گردد
نوبت های بعدی بر اساس محل گاز
گرفتگی و دستورالعمل وزارت
بهداشت تزریق خواهد شد.



دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
بیمارستان ثامن الحجج (ع)
(آموزش به بیمار)



گاز گرفتگی (توسط انسان و حیوان)

آخرین بازنگری فروردین ۱۴۰۵

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سایت بیمارستان تماس حاصل
نمائید.

Samenalhojajhp.sirums.ac.ir/fa

تعریف:

هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. اغلب به وسیله گزش با حیوان آلوده مانند سگ، گربه، خفاش، گاو به انسان منتقل میشود. در صورت بروز علائم هاری این بیماری درمان ناپذیر بوده و منجر به مرگ می شود

زمانی که پوست در اثر گاز گرفتگی

پاره میشود ممکن است دچار خونریزی شود و یا بر اثر باکتری های داخل دهان، آن محل عفونی گردد.

گاز گرفتگی هایی که منجر به پارگی پوست نمیشوند معمولاً خطرناک نیستند.

گاز گرفتگی توسط انسان میتواند به اندازه گاز گرفتگی حیوان خطرناک باشد زیرا انواع باکتری ها و ویروس های موجود در دهان انسان وجود دارد.

در مورد گربه و گربه سانان از طریق کشیدن پنجه آغشته به بزاق نیز انتقال بیماری صورت می گیرد



پیشگیری:

کودکان خود را در زمینه برخورد با حیوانات آموزش دهید

بچه ها اغلب نمیدانند چه چیزی باعث تحریک حیوانات میشود و ممکن است آن حیوان تحمل نکند و به کودک آسیب وارد کند

علائم بیماری در حیوان: ۱- اولین علامت بیماری تغییر در رفتار و عادات های حیوان است به نحوی که گوشه گیر و منزوی می شود یا عصبانی و بدخو

۲- به هر کس و حیوان همراه خود حمله میبرد ۳- کف از دهانش سرازیر شده ۴- صدای ناموزون دارد در نهایت حیوان در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد

علائم بیماری در انسان:

خستگی بی اشتهایی

افسردگی

بیقراری

تحریک پذیری و ترس از فضای باز و ترس از نور و آب

مرگ بیمار معمولاً در اثر فلج عضلات تنفسی رخ



اقدامات اولیه در برخورد با حیوان گزیدگی:

زخم را با آب و صابون بشوید

حتی با برس به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه زخم را بشوید

با استفاده از شیلنگ آب یا آبپاش باید کف و صابونهای باقیمانده در لابلای زخم کاملاً شسته شود

اگر شریانهای خونریزی دهنده هستند نیاز به شستشوی زخم نیست

از آنجاییکه احتمال عفونت این زخم ها زیاد است معمولاً در مرحله اول بخیه نمیشود و چندین نوبت زخم بیمار شستشو داده میشود و چند روز بعد که احتمال عفونت کاهش یافت زخم بخیه میگردد

مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و تزریق واکسن و سرم هاری

ابتلا به هاری مساوی مرگ است

